

Bipacksedel: Information till användaren

Locoid 0,1% kräm
Locoid 0,1% salva
Locoid 0,1% kutan lösning

hydrokortisonbutyrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Locoid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid
3. Hur du använder Locoid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Locoid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Locoid är och vad det används för

Locoid är ett medelstarkt kortisonpreparat (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.

Preparatet används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis. Locoid *kutan lösning* används också vid inflammation i hörselgången (extern otit).

2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid

Använd inte Locoid:

- om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen i Locoid.
- vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottor och varblåsor i ansiktet).
- vid utslag kring munnen (peroral dermatit),
- vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt.
- Locoid *kutan lösning* skall inte användas om det gått hål på trumhinnan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Locoid.

Undvik att få Locoid i ögonen. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Känsliga hudområden, t.ex. armhålor, ljumskar och runt ögonen bör endast behandlas kortvarigt. Locoid kan dölja, utlösa eller förvärra en hudinfektion. Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbingar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas.

Amning

Okänt om Locoid går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol, propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat

Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

3. Hur du använder Locoid

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är att Locoid påstrykes tunt 1-2 gånger dagligen. Vid inflammation i hörselgången droppas Locoid *kutan lösning* i örat enligt läkarens föreskrift.

Användning av olika läkemedelsformer

Locoid *kräm*: vätskande hudsjukdomar

Locoid *salva*: torra, fjällande hudsjukdomar

Locoid *kutan lösning*: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. Risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Infektioner i huden
- Knottor
- Rodnad och varblåsor i ansiktet
- Allergiska reaktioner.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som t.ex. trötthet, yrsel och illamående)
- Hudförtunning
- Utvidgning av små blodkärl i huden
- Vita strimmor i huden
- Akne, rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas)
- Bristningar i ytliga blodkärl
- Pigmentförändringar
- Ökad behåring
- Hudinflammationer
- Eksem.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- Dimsyn

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Locoid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C.

Locoid *kräm* skall förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

Locoid *kräm* och *salva*: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

Locoid *kutan lösning*: Öppnad flaska ska användas inom 8 veckor.

Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/flaskan öppnas på kartongen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är hydrokortisonbutyrat. 1 gram kräm, salva eller kutan lösning innehåller 1 mg hydrokortison (som butyrat).

- Övriga innehållsämnen i:

- Locoid *kräm* är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat och renat vatten.
Konserveringsmedel: propylparahydroxibensoat E 216 och butylparahydroxibensoat.

- Locoid *salva* är polyetylen och flytande paraffin.

- Locoid *kutan lösning* är glycerol, povidon, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, isopropylalkohol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Locoid kräm: 30 g, 50 g och 100 g tub.

Locoid salva: 30 g och 100 g tub.

Locoid kutan lösning: 30 ml, 100 ml och 250 ml plastflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danmark

Tillverkare

Temmler Italia S.R.L.,
Via delle Industrie 2,
20061, Carugate (MI),
Italien

Lokal företrädare:

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Tel: 040-352200

E-post: info.se@leo-pharma.com

Denna bipacksedeln ändrades senast: 2019-06-27